

# Analysis I

## 5. Übung – Mächtigkeit von Mengen

---

1. Man zeige: Sind  $A$  überabzählbar und  $B \subset A$  höchstens abzählbar, so ist  $A \setminus B$  überabzählbar.
2. Sind folgende Mengen abzählbar
  - (a)  $M = \{x \in \mathbb{R} : x = \sqrt[n]{m}, m, n \in \mathbb{N}\}$
  - (b) Menge der Primzahlen,
  - (c) die Menge aller komplexen Lösungen von Gleichungen der Form  $x^2 + px + q = 0$  mit  $p, q \in \mathbb{Z}$ ,
  - (d) die Menge aller Funktionen  $f : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}$ ,
  - (Z) die Menge der algebraischen Zahlen.
3. Geben Sie eine Bijektion zwischen folgenden gleichmächtigen Mengen an!
  - (a)  $\mathbb{N}, \mathbb{Z}$ ,
  - (b)  $[a, b], [c, d]$ , wobei  $a < b$  und  $c < d$ ,
  - (c)  $(-\infty, \infty), (0, \infty)$ ,
  - (d)  $(-\infty, \infty), (0, 1)$ ,
  - (e)  $[0, 1], (0, 1]$ .
4. Gilt  $[0, 1) \times [0, 1) \sim [0, 1)$ ? (Begründung)
5. Auf dem Mars steht ein Hotel mit unendlich vielen durchnummerierten Zimmern, welches voll belegt ist. (Der Einfachheit halber nehmen wir an, dass jeder Gast sein eigenes Zimmer hat.)
  - (a) Es kommen noch zwei Herren, die ebenfalls in diesem Hotel wohnen möchten. Ist dies möglich?
  - (b) 1100 Gäste reisen ab. Wie ist die Belegung des Hotels?
  - (c) Abzählbar unendlich viele Gäste reisen an. Können diese noch untergebracht werden? Wenn ja, wie?
  - (d) Derartige Hotels stehen auf allen Sternen. Aufgrund einer Havarie im Kosmos müssen (abzählbar) unendlich viele geschlossen werden. Kann unser Hotel den dadurch entstandenen Zimmerbedarf decken?
  - (e) Der Hotelchef wird vom gastronomischen Zentrum gebeten, alle möglichen Zimmerbelegungen aufzuschreiben. Er schreibt unendlich viele durchnummerierte Varianten auf. Das gastronomische Zentrum ist jedoch nicht zufrieden. Warum?
6. Es seien  $M$  eine beliebige nichtleere Menge und  $P(M)$  die Potenzmenge von  $M$ . Gibt es eine Bijektion zwischen  $M$  und  $P(M)$ ?
7. Zeigen Sie, dass eine Menge genau dann unendlich ist, wenn sie zu einer ihrer echten Teilmengen gleichmächtig ist.

**Zusatz:** Die Mengen  $A, B$  aus einem Mengensystem  $\mathcal{M}$  haben die Kardinalzahlen  $a, b$ , wobei  $a \leq b$  gilt. Ist durch  $A \preceq B \iff_{\text{def}} a \leq b$  eine Ordnungsrelation in  $\mathcal{M}$  gegeben?

**bitte wenden!**

---

## 5. Hausaufgabe

1. Zeigen Sie, dass für beliebige  $a, b \in \mathbb{R}$  mit  $a < b$  die Menge  $\{q \in \mathbb{Q} : a < q < b\}$  abzählbar ist.
2. Sind folgende Mengen abzählbar
  - (a)  $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ ,
  - (b)  $\mathbb{Q} \setminus \mathbb{Z}$ ,
  - (c) die Menge der irrationalen Zahlen,
  - (d)  $(0, 1) \subset \mathbb{R}$ ,
  - (e) Menge aller Funktionen  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = ax + b$  wobei  $a, b \in \mathbb{Q}$ ,
  - (f) Menge aller Funktionen  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = ax + b$  wobei  $a \in \{0, 1\}$ ,  $b \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ ?
3. Geben Sie eine Bijektion zwischen folgenden gleichmächtigen Mengen an!
  - (a)  $[0, 1)$ ,  $(0, 1]$ ,
  - (b)  $(0, 1)$ ,  $[0, 2]$ ,
  - (c)  $[0, 1]$ ,  $(-\infty, \infty)$ .
4. Seien  $A, B$  Mengen. Zeigen Sie: Aus  $A \sim C$  und  $B \sim D$  folgt  $A \times B \sim C \times D$ . ( $A \sim B$  bedeutet  $A$  gleichmächtig zu  $B$ .)  
Hinweis: Konstruieren Sie eine Bijektion!