

Numerik partieller Differentialgleichungen

Ein erstes Finite-Elemente-Verfahren

Idee des FE-Verfahrens: Zerlege Ω in einfache Teilgebiete. Approximiere V (z.B. $H^1(\Omega)$) durch einen Raum V_h von *stückweise* Polynomen auf diesen Teilgebieten. Wir wählen als Modellproblem wieder die homogene Dirichlet-Aufgabe (7.1), also in schwacher Formulierung:

$$\text{Finde } u \in V = H_0^1(\Omega) \text{ mit } \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, dx = \int_{\Omega} f v \, dx \quad \text{für alle } v \in H_0^1(\Omega).$$

Wir zerlegen („**triangulieren**“) $\bar{\Omega} = [0, 1] \times [0, 1] \subset \mathbb{R}^2$ in regelmäßige Dreiecke K_1, K_2, \dots, K_{N_T} mit $h =$ Länge der Katheten.




Abbildung 1: Triangulierung des Einheitsquadrates (mit $h = 1/3$) und eine Basisfunktion

Als Ansatzraum wählen wir stückweise lineare Polynome

$$V_h := \{v \in C(\bar{\Omega}) : v|_{K_i} \text{ ist lineares Polynom, } v|_{\Gamma} = 0\}.$$

Beachte: Die Eigenschaft $V_h \subset V = H_0^1(\Omega)$ folgt später aus einem allgemeineren Resultat (Satz 11.7).