

Übungen zur Vorlesung Analysis der partiellen Differentialgleichungen

<http://www.tu-chemnitz.de/~potts/lehre.php>

Übungsblatt 4

1. Man klassifiziere die folgenden partiellen Differentialgleichungen zweiter Ordnung und skizziere gegebenenfalls die Gebiete unterschiedlichen Typs:

a) $u_{xx} + 2yu_{xy} + xu_{yy} - u_x + u = 0$

b) $2xyu_{xy} + xu_y + yu_x = 0$

c) $u_{xx} + u_{yx} + 5u_{xy} + u_{yy} + 2u_{yz} + u_{zz} = 0$

2. Man transformiere die folgende Differentialgleichung auf Normalform.

$$x^2u_{xx} + 2xyu_{xy} + y^2u_{yy} + x^2u_x + xyu_y = 0$$

3. Man zeige, dass für konstantes $a > 0$ die Lösung des Anfangswertproblem der eindimensionalen Schwingungsgleichung

$$\begin{aligned}u_{tt}(x, t) &= a^2u_{xx}(x, t), & x \in \mathbb{R}, t > 0 \\u(x, 0) &= F(x), & x \in \mathbb{R} \\u_t(x, 0) &= G(x), & x \in \mathbb{R}\end{aligned}$$

mit Hilfe der D'Alembertschen Formel

$$u(x, t) = \frac{1}{2} [F(x + at) + F(x - at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} G(s) ds$$

angegeben werden kann.

4. Man betrachte das Anfangsrandwertproblem

$$\begin{aligned}u_{tt}(x, t) &= a^2u_{xx}(x, t), & x \in (0, L), t > 0 \\u(x, 0) &= F(x), & x \in (0, L) \\u_t(x, 0) &= G(x), & x \in (0, L) \\u_x(0, t) &= u_x(L, t) = 0, & t > 0,\end{aligned}$$

und zeige, im Falle der Existenz einer Lösung, deren Eindeutigkeit.